

الصف الخامس الجزء الثاني

أسئلة امتحان

الفيزياء

{الفصل الدراسي الأول}



سَلْطَنَةُ عُـمَّـانَ
وَفَارَاقَةُ الْبَيْتِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر
للعام الدراسي: ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الفصل الدراسي: الأول - الدور: الأول


* زمن الامتحان: (ساعتان ونصف).
* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.
* عدد صفحات الأسئلة: (١٢) صفحة.
* تكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
١	١-٣			
٢	٤-٥			
٣	٦-٧			
٤	٨-٩			
٥	١٠			
٦	١١-١٢			
٧	١٣-١٥			
٨	١٦-١٧			
٩	١٨-١٩			
١٠	٢٠-٢١			
١١	٢٢			
١٢	٢٣			
المجموع			جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف			درجة/درجات فقط.	

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

- ١- يبين الشكل (١-١) مقياس لدرجة الحرارة (الثرموميتر) .
أوجد القراءة الصحيحة لمقياس الحرارة متضمناً النسبة المئوية لقيمة عدم اليقين . [3] ()
وضح خطوات الحل.



الشكل (١-١)

قراءة الثرمومتر = (——— ± ———)

- ٢- يتم حساب القدرة الضائعة في المقاومة من خلال القانون:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

حيث V هو فرق الجهد للمقاومة R .

إذا علمت أن النسبة المئوية لقيمة عدم اليقين في V تساوي (5%) ، والنسبة المئوية لقيمة عدم اليقين في R تساوي (2%) .

- ما النسبة المئوية لعدم اليقين في حساب القدرة ؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [1] ()

12% ☐

8% ☐

7% ☐


3% ☐

- ٣- قارن بين مصطلح كل من الدقة والضبط في الجدول الآتي : [2] ()

الضبط	الدقة

() [3]

٤- أوجد قراءة الميكرومتر في الشكل (٤-١).



الشكل (٤-١)

قراءة الميكرومتر = (_____ mm)

٥- أراد طالب في الصف الحادي عشر التأكد من مقدار كتلة عن طريق قياسها عدة مرات بواسطة ميزان في البقالة ، وحصل على القياسات المبينة في الجدول (٥ - ١) .

القياس	القراءة 1	القراءة 2	القراءة 3	القراءة 4
	1.02	1.03	0.98	1.10

الجدول (٥-١)

() [3]

احسب قيمة الكتلة وعدم اليقين المطلق في قياسات الطالب .
موضحا خطوات الحل .


قيمة الكتلة = (_____ ± _____) Kg

٦- قطع راكب دراجة نارية مسافة (60 Km) في أول ساعتين، ثم قطع مسافة (80Km) في الساعات الثلاث التالية.
احسب سرعته المتوسطة بوحدة (Kmh^{-1}) .

() [2]

السرعة المتوسطة = (Kmh^{-1})

٧- يوضح التمثيل البياني في الشكل (٧-١) العلاقة بين الإزاحة والزمن لحركة جسم في خط مستقيم.




() [2]

احسب السرعة المتجهة للجسم.

السرعة المتجهة = (ms^{-1})

٨- ينطلق قطار من محطة عند الزمن $(t = 0)$.
يوضح التمثيل البياني في الشكل (٨-١) كيف تتغير المسافة بين القطار والمحطة مع مرور الزمن .




الشكل (٨-١)

[1] () أي عبارة صحيحة تصف حركة القطار بين (t_1) و (t_2) ؟
(ظلل الإجابة الصحيحة)


- ☐ تتناقص سرعته ويبتعد عن المحطة.
- ☐ تتناقص سرعته ويتحرك نحو المحطة.
- ☐ تزداد سرعته ويبتعد عن المحطة.
- ☐ تزداد سرعته ويتحرك نحو المحطة.

[3] () ٩- احسب حاصل $(\vec{A} - \vec{B})$ مقداراً واتجاهاً.




١٠ - تحركت شاحنة مسافة (5 Km) باتجاه الشرق، ثم تحركت مسافة (3 Km) بزاوية مقدارها (60°) شمال الشرق.

احسب مقدار إزاحة الشاحنة بوحدة (Km) بيانياً. [3] ()



- ١١- يوضح الشكل (١-١١) كرة تقذف بسرعة ابتدائية متجهة ($u = 20 \text{ ms}^{-1}$) وبزاوية مقدارها (60°) مع الاتجاه الأفقي .



الشكل (١-١١)

- ما مقدار سرعة الكرة عندما تصل إلى أقصى ارتفاع بوحدة (ms^{-1}) ؟ [1] ()
(ظلل الإجابة الصحيحة)

20 ☐17.3 ☐10 ☐0 ☐

- ١٢- من خلال معادلات الحركة الخطية التالية :


$$v = u + at \rightarrow 1$$

$$s = \frac{u + v}{2} t \rightarrow 2$$

- وضح خطوات اشتقاق معادلة الحركة الخطية الرابعة [3] ()

$$v^2 = u^2 + 2as$$

- يوضح الشكل (١٣-١) العلاقة البيانية لحركة سيارة في خط مستقيم تتغير سرعتها مع الزمن.



بالرجوع إلى الشكل (١٣-١) أجب عن الأسئلة ١٣-١٥ :

١٣- احسب التسارع خلال الفترة $s(20 - 30)$. [3] ()

التسارع = (ms^{-2})

١٤- ما الإزاحة المقطوعة خلال الفترة $s(30 - 50)$ بوحدة (m) ؟ [1] ()
(ظلل الإجابة الصحيحة)

1250 ☐

625 ☐

375 ☐


250 ☐

١٥- صف حركة السيارة خلال الفترة $s(10 - 50)$. [3] ()

- ١٦- يقوم أحمد بقذف كرة رأسيا ولاحظ بعد زمن (3 s) تغير اتجاه الكرة للأسفل. احسب السرعة الابتدائية (u) التي قُذفت بها الكرة ؟ [3] ()

السرعة الابتدائية u (ms^{-1}) = ()


- ١٧- يوضح الشكل (١٧ - ١) قذف كرة جولف من النقطة (A) بسرعة ابتدائية متجهة مقدارها (40 m.s^{-1}) وبزاوية (30°) مع الاتجاه الأفقي. أثناء طيرانها لأسفل تصطدم بلوحة إعلانية عند النقطة (B) على ارتفاع (15.1 m) فوق المستوى .



الشكل (١٧-١)

- احسب السرعة الرأسية التي تصطدم بها الكرة في اللوحة عند النقطة (B). [6] ()
وضح خطوات الحل

السرعة الرأسية عند النقطة B (ms^{-1}) = ()



[3] ()


١٨- أكمل الفراغات في الجدول (١٨ - ١).

الحالة	النتيجة	السبب	قانون نيوتن المفسر للحالة
انطلاق الحافلة المتوقفة فجأة للأمام	تحرك الطلاب باتجاه _____	_____	_____

الجدول (١٨ - ١)


[1] ()

١٩- يوضح الشكل (١٩-١) سقوط كرة داخل حوض ماء. أي الخيارات التالية تعتبر صحيحة ؟ (ظل الإجابة الصحيحة).



الشكل (١٩-١)

حالة الجسم	B	A	
سيطفو	قوة الطفو	قوة الوزن	☐
سيطفو	قوة الوزن	قوة الطفو	☐
سيغرق	قوة الوزن	قوة الطفو	☐
سيغرق	قوة الطفو	قوة الوزن	☐



٢٠- يوضح الشكل (١-٢٠) مجموعة قوى مؤثرة على صندوق كتلته (3Kg) .

اتجاه الحركة



الشكل (١-٢٠)


[3] ()

احسب تسارع الصندوق .

وضح خطوات الحل

التسارع = (ms^{-2})

٢١- الشكل (١-٢١) يوضح انزلاق صندوق كتلته (m) على سطح مائل خشن .



الشكل (١-٢١)

[3] ()

ارسم مخطط القوى الثلاث المؤثرة على الصندوق .

٢٢- يبين الشكل (٢١ - ١) عملية قفز مظلي .




الشكل (٢٢ - ١)

أياً مما يلي يصف تسارع المظلي وسرعته المتجهة عند وصوله للسرعة الحدية ؟ [1] ()
(ظلل الإجابة الصحيحة)

تسارع المظلي	سرعة المظلي المتجهة	
ثابت	ثابتة	☐
ثابت	صفر	☐
صفر	ثابتة	☐
صفر	صفر	☐

٢٣- يوضح الشكل (١-٢٣) سحب زلاجة على طول مسار جليدي بواسطة قوتين. مقدار القوة ($F_1 = 200 \text{ N}$) ومقدار القوة ($F_2 = 120 \text{ N}$).



الشكل (١-٢٣)

احسب القوة الأفقية المحصلة التي تؤثر على الزلاجة .
وضح خطوات الحل

[6] ()

القوة الأفقية المحصلة = (————— N)

ملحق القوانين والثوابت لامتحان الصف الحادي عشر / مادة الفيزياء

$$\text{النسبة المئوية لعدم اليقين} = \frac{\text{قيمة عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100$$

$$\frac{\text{المدى}}{2} = \text{عدم اليقين المطلق}$$

$$\vec{V} = \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$$

$$\frac{\text{الازاحة}}{\text{الزمن}} = \text{السرعة المتجهة المتوسطة}$$

$$\frac{\text{المسافة الكلية المقطوعة}}{\text{الزمن الكلي المستغرق}} = \text{السرعة المتوسطة}$$

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$2\pi r = \text{محيط الدائرة}$$

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$F = ma$$

$$g = 9.81 \text{ms}^{-2}$$



سَلْطَنَةُ عُيْمَانِ
وِزَارَةُ التَّحْيِيَّةِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر
للعام الدراسي: ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الفصل الدراسي: الأول - الدور: الثاني


* عدد صفحات الأسئلة: (١٢) صفحة.
* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

* زمن الامتحان: (ساعتان ونصف).
* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
١	١-٢			
٢	٣-٤			
٣	٥-٦			
٤	٧-٩			
٥	١٠			
٦	١١			
٧	١٢-١٤			
٨	١٥-١٧			
٩	١٨			
١٠	١٩-٢٠			
١١	٢١-٢٢			
١٢	٢٣			
المجموع			جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف				درجة/درجات فقط.

١- يوضح الشكل (١-١) قياس عرض كتلة خشبية باستخدام القدم ذات الورنية.



الشكل (١-١)

(3) []

ما قياس عرض القطعة الخشبية ؟


عرض الكتلة الخشبية = (————— mm)



(1) []


٢- أيا من المخططات الآتية يمثل الأقل دقة والأكثر ضبطاً عند الحصول على

نتائج تجربة ما .

(ظلل الإجابة الصحيحة)


☐


☐

☐

☐



- ٣- أذكر اثنين من الكميات الأساسية للنظام الدولي للوحدات (SI) ووحدات قياسها في الجدول الآتي :

وحدة قياسها	الكمية الأساسية

- ٤- يوضح الشكل (٤-١) قياس طول قطعة من الحلوى باستخدام مسطرتين .



الشكل (٤-١)

- أيا من المسطرتين أكثر دقة في القياس. وضح السبب.


[3] ()

- ٥- وجد أن النسبة المئوية لعدم اليقين في قياس كتلة صندوق يساوي (1.6 %) ،
وقيمة عدم اليقين المطلق يساوي (0.4 Kg) .
احسب كتلة الصندوق . (وضح خطوات الحل) .

[3] ()

كتلة الصندوق = $(\text{—————} kg)$

- ٦- يوضح الشكل (٦ - ١) تحرك جسم مسافة مقدارها $(S_1 = 40m)$ باتجاه الشرق لمدة $(5 s)$ ، ثم مسافة مقدارها $(S_2 = 20m)$ باتجاه الشرق أيضا لمدة $(2 s)$ ، ثم عاد قاطعا مسافة $(S_3 = 10m)$ لمدة $(4 s)$.



الشكل (٦ - ١)


احسب السرعة المتوسطة للجسم. [3] ()

السرعة المتوسطة = $(\text{—————} ms^{-1})$

٧- عرف مفهوم الكمية العددية ؟ [1] ()

٨- يوضح الشكل (٨-١) حركة كائن في مسار دائري من النقطة w إلى z عكس عقارب الساعة مروراً بـ y ثم x ثم يعود إلى النقطة w .

ما الوصف الصحيح لإزاحة الجسم والمسافة التي يقطعها خلال حركته ؟ [1] ()
(ظلل الإجابة الصحيحة)




الشكل (٨-١)

الإزاحة (m)	المسافة (m)	
صفر	9π	☐
صفر	6π	☐
6π	صفر	☐
6π	9π	☐

٩- في مباراة لكرة القدم، يبعد اللاعب الأول عن الكرة مسافة (50 m) ويجري بسرعة (3 ms^{-1}) نحوها، ويبعد اللاعب الثاني عن الكرة مسافة (35 m) ويجري بسرعة (2 ms^{-1}) نحوها.

أي اللاعبين يلحق بالكرة أولاً؟ [3] ()

- ١٠- يوضح الشكل (١٠-١) حركة قارب يغادر النقطة A متحركاً في خط مستقيم إلى النقطة B. وتستغرق رحلته (60 s)




الشكل (١٠-١)

احسب السرعة المتجهة المتوسطة للقارب مقداراً واتجاهاً. [3] ()

السرعة المتجهة المتوسطة = $(\text{—————} ms^{-1})$ ، الزاوية = (—————)

- يوضح التمثيل البياني في الشكل (١١-١) منحنى (السرعة - الزمن) لحركة قطار في خط مستقيم .



الشكل (١١-١) الزمن (s)

أجب عن الأسئلة (١١-١٣) :

١١- صف ما يحدث لكل من الإزاحة والسرعة والتسارع خلال الفترة الزمنية s (0- 50) :

[3] ()

الوصف	
الإزاحة	_____
السرعة	_____
التسارع	_____

() [1]

١٢- ما قيمة التسارع الذي يتحركه القطار خلال الفترة $s (50 - 90)$ ؟
(ظلل الإجابة الصحيحة)

+6.66 ☐

-6.66 ☐


+0.15 ☐

-0.15 ☐

() [3]

١٣- احسب الازاحة الكلية للقطار. (موضحاً خطوات الحل)

١٤- يوضح الشكل (١٤-١) سائق دراجة نارية يتحرك أفقياً وينطلق من ارتفاع (1.25m) فوق سطح الأرض ليهبط على مسافة (10m)



الشكل (١٤-١)

() [6]


احسب سرعة الانطلاق . (موضحاً خطوات الحل).

- ١٥- تنطلق سيارة من السكون بتسارع ثابت مقداره (3 ms^{-2}) احسب السرعة التي تصل إليها السيارة بعد مرور (5 s)

[3] ()

السرعة = $(\text{—————} \text{ms}^{-1})$

- ١٦- يوضح الشكل (١-١٦) قذف كرة بسرعة ابتدائية متجهه مقدارها (10 ms^{-1}) وبزاوية (25°) مع الإتجاه الافقي



الشكل (١-١٦)

- ما قيمة السرعة الأفقية لحظة اصطدامها بالأرض ؟
(ظل الإجابة الصحيحة)


[1] ()

8.4 ☐9.1 ☐4.2 ☐0 ☐

- ١٧- يقوم أحد الطلاب باجراء تجربة القفز بحبل مرن ويمسك ساعة ايقاف في يده. اشرح الاجراءات التي يمكن للطالب من خلالها الاستفادة من التجربة لحساب تسارع السقوط الحر.

[3] ()

١٨- يوضح الشكل التخطيطي (١٨-١) جسمًا تحت تأثير قوى متعامدة:




الشكل (١٨-١)

احسب مقدار واتجاه محصلة القوتين المؤثرة على الجسم مستخدماً مثلث المتجهات. [3] ()

مقدار المحصلة = (_____ N) ، الزاوية = (_____)


١٩ - يوضح الشكل (١٩-١) جسم ينزلق على سطح مائل أملس .



أي رمز يمثل قوة التلامس العمودية المؤثرة على الجسم؟ [1] ()

D ☐C ☐B ☐A ☐

٢٠ - يوضح الشكل (٢٠-١) مجموعة قوى مؤثرة على مجسم كروي كتلته (2Kg) .



الشكل (٢٠-١)

احسب تسارع المجسم الكروي. [3] ()

التسارع = (ms^{-2})

٢١- يوضح الشكل (١-٢١) فقاعة صابون ترتفع خلال سائل .



الشكل (١-٢١)

ارسم مخطط القوى الثلاث المؤثرة على الفقاعة في الشكل أثناء صعودها خلال السائل. [3] ()

٢٢- قفز مظلي كتلته (65 Kg) من طائرة.


أي البدائل الآتية صحيحة_ عندما يصل المظلي إلى سرعته الحدية ؟

(ظل رمز الإجابة الصحيحة)

[1] ()

البديل	تسارع المظلي (ms^{-2})	قوة مقاومة الهواء (N)
☐	9.81	صفر
☐	9.81	640
☐	صفر	صفر
☐	صفر	640

٢٣- يوضح الشكل (١-٢٣) سحب صندوق بواسطة قوتين مقدار كلا منهما $(40N)$.



الشكل (١-٢٣)

[6] ()

احسب مقدار القوة المحصلة المؤثرة على الصندوق واتجاهها (مع توضيح خطوات الحل).

القوة المحصلة = (_____ N)

- انتهت الأسئلة -

ملحق القوانين والثوابت لامتحان الصف الحادي عشر / مادة الفيزياء

$$\text{النسبة المئوية لعدم اليقين} = \frac{\text{قيمة عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100$$

$$\text{عدم اليقين المطلق} = \frac{\text{المدى}}{2}$$

$$\vec{V} = \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$$

$$\frac{\text{الازاحة}}{\text{الزمن}} = \text{السرعة المتجهة المتوسطة}$$

$$\frac{\text{المسافة الكلية المقطوعة}}{\text{الزمن الكلي المستغرق}} = \text{السرعة المتوسطة}$$

$$\frac{\text{المسافة الكلية المقطوعة}}{\text{الزمن الكلي المستغرق}} = \text{السرعة المتوسطة}$$

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{محيط الدائرة} = 2\pi r$$

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$F = ma$$

$$g = 9.81 \text{ms}^{-2}$$



سَلْطَنَةُ عُـمَّـانَ
وَفَاءُ لِلدِّينِ وَالنَّسَبِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

للعام الدراسي: ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

الدور: الأول - الفصل الدراسي: الأول

* عدد صفحات الأسئلة: ١١ صفحة.

* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

* زمن الامتحان: ساعتان ونصف

* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المراجع
١	٣-١			
٢	٤			
٣	٧-٦-٥			
٤	٨			
٥	١٠-٩			
٦	١١			
٧	١٢			
٨	١٤-١٣			
٩	١٦-١٥			
١٠	١٨-١٧			
١١	١٩			
المجموع			جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف			درجة/درجات فقط.	


أجب عن جميع الأسئلة الآتية



الشكل (١-١)

(١) ما الأداة التي تستخدم لقياس القطر الخارجي للغطاء بدقة في الشكل (١-١)؟
 ظلل الإجابة الصحيحة: [١] ()

☐ المسطرة ☐ القدم ذات الورنية ☐ الشريط المتري ☐ المنقلة



الشكل (١-٢)

(٢) ما مقدار قراءة الميكرومتر في الشكل (١-٢)؟

قراءة الميكرومتر : mm [٣] ()


(٣) قام طالبان من الصف الحادي عشر بقياس زمن لحركة عربة تقطع مسافة معينة ، وسجلت النتائج في الجدول (١-٣):

الزمن بالثواني / الطلاب	الطالب (١)	الطالب (٢)
التجربة (١)	5.1	5.2
التجربة (٢)	5.0	6.0
التجربة (٣)	5.1	4.7

الجدول (١-٣)

- فسر: يعتبر الطالب الأول أكثر دقة في قياس الزمن من الطالب الثاني .

[٢] ()



٤) أراد طالب حساب قياس طول الصف بالشريط المتري وكرر القياسات عدة مرات كما هو موضح في الجدول (٤-١):

3.8	3.7	3.8	3.9	طول الصف (m)
-----	-----	-----	-----	--------------


الجدول (٤-١)

أ) أحسب عدم اليقين لطول الصف. (موضحاً خطوات الحل)

مقدار عدم اليقين لطول الصف : _____ [٣] ()

ب) أحسب النسبة المئوية لعدم اليقين لطول الصف . (موضحاً خطوات الحل)

النسبة المئوية لعدم اليقين لطول الصف : _____ [٥] ()



٥) قارن في جدول (١-٥) بين الكميات العددية والكميات المتجهه : [٢] ()

الكمية الفيزيائية	الكمية العددية	الكمية المتجهه
المفهوم		
مثال		

الجدول (١-٥)


٦) قطعت غزال مسافة قدرها (300m) في (90 s) ثم واصلت حركتها وقطعت مسافه (400m) بزمّن قدره (120 s).
أحسب السرعة المتوسطة للغزال بوحدة (m/s). (موضحاً خطوات الحل)

السرعة المتوسطة = m/s [٣] ()

٧) يتحرك جسم كما في المخطط (١-٧).

() [١] (ظلل الإجابة الصحيحة)

ما الفترة الزمنية الذي يكون فيها الجسم سرعته ثابتة ؟



المخطط (١-٧)

(من 0 إلى 350) ☐

(من 0 إلى 150) ☐


(من 250 إلى 300) ☐

(من 150 إلى 250) ☐

٦


٨) تبحر سفينة مسافة (4 km) بزاوية 45° شمال الشرق ، ثم انعطفت باتجاه الشمال مسافة (3 km) .

(أ) ارسم مخططاً بمقياس رسم مناسب لرحلة السفينة . [٣] () .




(ب) أوجد محصلة إزاحة السفينة بيانياً (تذكر ان تتضمن الاجابة مقدارا واتجاها) .

[٢] ()



٩) الشكل البياني (٩-١) يوضح منحني (السرعة المتجهة - الزمن) لسيارتين (A) و (B):




أ) حدد الزمن الذي تتساوى فيها سرعة السيارتان (A) و (B) .

() [٢] _____

ب) أحسب الإزاحة التي تقطعها السيارة (A) خلال 40 s .
(موضحاً خطوات الحل)

إزاحة السيارة _____ m [٣] ()

الشكل (٩-١)




الشكل (١٠-١)


١٠) الشكل (١٠-١) يمثل حركة كرة تسقط من أعلى بناية سقوطاً حراً علماً بأن (تسارع الجاذبية الأرضية 9.81 m/s^2).

- أحسب طول البناية بالمتر إذا كان الزمن اللازم لكي تصل الكرة إلى الأرض تساوي (3 s).
(بإهمال مقاومة الهواء.) (موضحاً خطوات الحل)

طول البناية = _____ m [٣] ()




١١) قذفت كرة بسرعة متجهه ابتدائية تساوي (20 m / s) بزاوية (60°)، فوصلت إلى أقصى ارتفاع عند نافذة بناية . كما هو موضح في الشكل (١-١١).



الشكل (١-١١)

- احسب البعد الأفقي للكرة عن قاعدة المبنى قبل قذفها.
(موضحاً خطوات الحل)

البعد الأفقي m = [٤] ()




١٢) في تجربة لتحديد تسارع الجاذبية الأرضية ، تم قياس زمن سقوط الكرة من السكون من ارتفاع (h) وتم تسجيل نتائج التجربة بين ارتفاع (h) ومربع الزمن (t^2) كما هي موضحة في الجدول (١-١٢) :

h (m)	5.4	7.8	10.2	12.6	15.0
t^2 (s)	1.13	1.63	2.13	2.63	3.13


الجدول (١-١٢)

أ) ارسم منحنى التمثيل البياني بين ارتفاع الكرة (h) على المحور الرأسي و مربع الزمن (t^2) على المحور الأفقي. [٣] ()



ب) احسب تسارع الجاذبية من خلال هذه التجربة . (موضحاً خطوات الحل)

[٣] () _____




١٣) ما القانون الفيزيائي الذي اعتمدت عليه الفتاة في سحب المفرش دون أن تقع الأدوات على الأرض كما في الشكل (١-١٣)؟
 ظلل الإجابة الصحيحة : [١] ()




الشكل (١-١٣)

☐ نيوتن الأول
☐ نيوتن الثاني
☐ نيوتن الثالث
☐ التسارع

١٤) يوضح الشكل (١-١٤) انزلاق صندوق أثناء انحداره على سطح خشن . أرسم على الشكل مخطط القوى المؤثرة على الصندوق . [٣] ()



الشكل ١-١٤



١٥) تم سحب سيارة بقوة قدرها 3000N أفقياً فاكسبت تسارعاً قدرة (3m/s^2).
ما مقدار كتلة السيارة ب (kg) ؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()

9000 ☐

6000 ☐


2000 ☐

1000 ☐


١٦) تحلق طائرة وزنها ($3 \times 10^5 \text{ N}$) أفقياً بقوة محرك مقداره ($6 \times 10^5 \text{ N}$).
احسب مقدار محصلة القوى المؤثرة على الطائرة باستخدام مثلث المتجهات.
(يجب أن تتضمن الإجابة مقداراً واتجاهاً ، مع التوضيح بخطوات الحل).



[٣] () _____



١٧) أسقطت كرة كتلتها (0.5Kg) في أنبوبة بها سائل . كما هو موضح في الشكل (١٧-١)




الشكل (١٧-١)

- أحسب تسارع الكرة إذا كانت قوة مقاومة السائل لها تساوي (2 N) ؟
(موضحاً خطوات الحل)

تسارع الكرة = m/s^2 [٣] ()


١٨) يمثل المخطط (١٨-١) صندوقاً متزنًا موضوع فوق طاولة :




مخطط (١٨-١)

- احسب كتلة الصندوق . (موضحاً خطوات الحل)

[٣] ()




١٩) يوضح الشكل (١٩-١) متسلق جبال وزنه (800N) وهو يحاول الهبوط من قمة جبل فيتعلق بالحبل ويدفع الصخرة بشكل أفقي عندما يكون المتسلق في حالة الاتزان .
احسب قوة الشد في الحبل . (موضحاً خطوات الحل)



الشكل ١٩-١

قوة الشد في الحبل = _____ N [٣] ()



— انتهت الأسئلة —

القوانين والثوابت

م	الوحدة	القوانين
1	المهارات العملية	النسبة المئوية لعدم اليقين = $\frac{\text{قيمة عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100\%$
2	السرعة والسرعة المتجهة	$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$
3	الحركة المتسارعة	$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{u}}{t}$
4	القوى	$\vec{F} = m\vec{a}$

الثوابت
$g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$

قوانين رياضية تكاملية
مساحة المستطيل = الطول × العرض مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$ $\text{Tan} \emptyset = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

المسودة



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
وَفَاءَةُ الدِّينِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

للعام الدراسي: ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

الدور: الأول - الفصل الدراسي: الأول (الفترة المسائية)

* عدد صفحات الأسئلة: ٩ صفحات.

* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

* زمن الامتحان: ساعتان ونصف


* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المراجع
١	٢-١			
٢	٤-٣			
٣	٧-٦-٥			
٤	٨			
٥	١١-١٠-٩			
٦	١٣-١٢			
٧	١٥-١٤			
٨	١٧-١٦			
٩	١٧			
المجموع			جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف	درجة/درجات فقط.			

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

(١) ما القراءة الصحيحة لقراءة طول السهم في الشكل (١-١) ؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()



الشكل (١-١)

2.1 ☐

2.2 ☐

2.3 ☐

2.4 ☐

(٢) بطارية فرق الجهد بين طرفيها يساوي (2.5 V)، فقام طالب بقياس فرق الجهد بين طرفي بشارية باستخدام جهاز الفولتميتر وحصل على النتائج التالية كما في الجدول (١-٢) :

عدد المحاولات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
قيمة فرق الجهد المقاسة ب (V)	2.8	2.3	2.1	2.9


الجدول (١-٢)

(أ) فسر: قراءات التي حصل عليها الطالب غير مضبوطة .

[٢] () _____

(ب) ما مفهوم الخطأ العشوائي ؟

[٢] () _____



(٣) تم قياس ارتفاع ماء في وعاء فكانت النتيجة (20.4 ± 0.2) cm .

(أ) ما مقدار عدم اليقين في قياس ارتفاع الماء ؟


() [٢] _____

(ب) أحسب النسبة المئوية لعدم اليقين في هذا القياس .


() [٢] _____

(٤) تحركت سيارة بسرعة بمقدار (100.0 ± 2.0) m/s خلال زمن (50.0 ± 0.3) s .
أحسب عدم اليقين للمسافة التي قطعتها السيارة . (موضحاً خطوات الحل)

() [٥] _____



٥- الشكل (١-٥) يوضح منحنى (الإزاحة - الزمن) :



الشكل (١-٥)

ما الوصف الصحيح للمنحنى البياني لجسمان A و B ؟
(ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()

☐ السيارة A أسرع من السيارة B

☐ السيارة B أسرع من السيارة A

☐ السيارة A و B سرعتهم متساوية

☐ السيارة A تقطع إزاحة أكبر من السيارة B

٦) قام طالب بتحريك عربة مسافة (50 m) ثم (30 m) وسجل زمن قطع المسافة على التوالي (3 s) ثم (2s) .
أحسب السرعة المتوسطة للعربة. (موضحاً خطوات الحل)

() [٢]


٧) ما الكمية الفيزيائية التي يجب تحديدها مقداراً واتجاهاً ؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()

☐ المساحة

☐ الكتلة

☐ التسارع

☐ الزمن



- ٨) طائر النورس يحلق باتجاه الغرب مسافة (4 m) ثم أكمل التحليق بانعطاف نحو الشمال مسافة (5 m) .
أ) احسب المسافة الكلية التي قطعها طائر النورس.


المسافة = m _____ [٢] ()

- ب) أرسم رسماً بيانياً لحركة لطائر النورس بمقياس رسم مناسب . [٣] ()



- ج) أحسب رياضياً محصلة الإزاحة مقداراً واتجاهاً .


[٢] ()



٩) يتحرك سائق سيارة بسرعة (10 m /s) ، فتفاجأ بإشارة قف على الطريق فضغط على المكابح حتى توقف :
أ) احسب المسافة اللازمة للتوقف ، علماً بأن السيارة تتباطأ بمقدار (5 m /s²). (موضحاً خطوات الحل)

[٣] ()

١٠) الرسم البياني الذي يمثل حركة سيارة تتحرك بسرعة ثابتة ثم تتباطأ عند الضغط على المكابح .
ما الشكل البياني الذي يوصف حركة السيارة ؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()




١١) المنحنى البياني (١١ - ١) يوضح العلاقة البيانية بين السرعة المتجهة لجسم ما يتحرك بتسارع ثابت مع مرور الزمن.


- اشتق معادلة الإزاحة (S) بدلالة الزمن .

وذلك بإستخدامك المساحة تحت المنحنى حيث أن :

المساحة تحت المنحنى = مقدار الإزاحة




المنحنى البياني (١١ - ١)



[٣] ()

(١٢) قذف حجر إلى أعلى باتجاه جدار بسرعة ابتدائية مقدارها (40 m.s^{-1}) و بزاوية 60° كما يوضحه الشكل (١٢-١) فوصل الحجر إلى النقطة (A) بعد مرور (3 s) من القذف.




الشكل (١٢-١)

- احسب ارتفاع الجدار . (موضحاً خطوات الحل)

() [٥]

(١٣) يوضح الشكل (١٣-١) العلاقة البيانية بين السرعة المتجهة و الزمن لجسم ما يسقط سقوطاً حراً :



(أ) احسب تسارع الجاذبية الأرضية. (موضحاً خطوات الحل)


() [٣]

(ب) احسب المسافة الرأسية التي قطعها الجسم منذ بدء سقوطه حتى الزمن (0.2 s) . (موضحاً خطوات الحل)

() [٣]

١١

(١٤) ما الشكل الصحيح الذي يمثل اتجاه قوة التماس العمودية المؤثرة على الصندوق؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١]



(١٥) ينزل متزلج كتلته 65 Kg تحت تأثير وزنه من أعلى منحدر عديم الاحتكاك يميل عن الأفق بزاوية 60° كما موضح في الشكل (١-١٦).




الشكل (١-١٦)

(أ) احسب تسارع المتزلج. (موضحاً خطوات الحل)

() [٢] _____


(ب) أثبت رياضياً بأن تسارع المتزلج يقل عندما تؤثر عليه قوة مقاومة لحركته وقدرها (100 N) .

() [٣] _____



١٦) أوجد وحدة قياس طاقة الوضع ($PE = mgh$) بدلالة الوحدات الأساسية للنظام الدولي للوحدات (SI).


() [٢]



الشكل (١٧-١)

أ) حدد أنواع القوى المؤثرة على السفينة و تمثلها الأرقام التالية :



- ١- _____ [١] ()
٢- _____ [١] ()
٣- _____ [١] ()



ب) احسب تسارع السفينة ، اذا كانت كتلة السفينة تبلغ (30000 kg) . (موضحاً خطوات الحل)

[٣] ()

ج) ارسم منحنى بياني يصف سرعة السفينة خلال (10s) بدءاً من السكون . علماً بأن سرعة السفينة تصل إلى السرعة الحدية بعد (3 s) ، موضحاً قيمة السرعة الحدية على الرسم البياني . [٣] ()



— انتهت الأسئلة —

القوانين والثوابت

م	الوحدة	القوانين
1	المهارات العملية	النسبة المئوية لعدم اليقين = $\frac{\text{قيمة عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100\%$
2	السرعة والسرعة المتجهة	$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t}$
3	الحركة المتسارعة	$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{u}}{t}$
4	القوى	$\vec{F} = m\vec{a}$

الثوابت
$g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$

قوانين رياضية تكاملية
مساحة المستطيل = الطول × العرض مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$ $\text{Tan} \emptyset = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

المسودة

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

للعام الدراسي: 1444 هـ - 2023/2022 م


الدور: الثاني - الفصل الدراسي: الأول

* زمن الامتحان: ساعتان ونصف
* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.
* عدد صفحات الأسئلة: 8 صفحة.
* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
1	4-1			
2	6-5			
3	8-7			
4	10-9			
5	12-11 أ			
6	12 ب - 14			
7	17-15			
8	19-18			
المجموع			جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف		درجة/درجات فقط.		


أجب عن جميع الأسئلة الآتية



(1) الشكل (1-1) يوضح قياسات مختلفة، وأن القراءة الحقيقية هي (x) .
أي الخيارات تكون صحيحة ؟ (ظلل الاجابة الصحيحة) [1]

- ☐ مضبوطة ودقيقة
☐ مضبوطة وغير دقيقة
☐ غير مضبوطة ودقيقة
☐ غير مضبوطة وغير دقيقة

(2) أوجد قراءة القدمة ذات الورنية في الشكل (1-2) .



الشكل (1-2)

قراءة القدمة: cm [3]

(3) قام طالب بقياس أطوال مجموعة من قطع القماش المسجل عليها طولها الحقيقي، وسجلت النتائج في الجدول (1-3):

الجدول (1-3)

رقم قطعة القماش	الطول الحقيقي المسجل علي القطعة (m)	قراءة الطالب (m)
القطعة (1)	5.1	5.2
القطعة (2)	6.5	6.6
القطعة (3)	9.9	10

- فسر: الخطأ في القياس عند الطالب يعتبر خطأ نظامي.

[2]

(4) قارن في الجدول (1-5) بين المسافة والازاحة. [2]

الجدول (1-5)

الكمية الفيزيائية	المسافة	الازاحة
كمية عددية أم متجهة		
مثال		

(5) أراد طالب تعيين كتلة مكعب من الحديد وكرر القياسات عدة مرات كما هو موضح في الجدول (1-4):

كتلة المكعب (kg)	1.9	1.8	1.7	1.8
------------------	-----	-----	-----	-----

الجدول (1-4)

(أ) أحسب عدم اليقين لكتلة المكعب. (موضحاً خطوات الحل)


[3] _____

(ب) أحسب النسبة المئوية لعدم اليقين لكتلة المكعب. (موضحاً خطوات الحل)

[5] _____

(6) قطع أسد مسافة قدرها 150 m خلال 45 s ، ثم واصل حركته وقطع مسافة (200m) خلال زمن قدره (60 s). أحسب السرعة المتوسطة للأسد بوحدة ($m.s^{-1}$). (موضحاً خطوات الحل)

السرعة المتوسطة = $m.s^{-1}$ [3] _____



المخطط (1-7)


(7) يتحرك جسم كما في المخطط البياني (1-7).
ما المرحلة التي تكون فيها سرعة الجسم تساوي صفراً. (ظلل الإجابة الصحيحة) [1]

(A) ☐ (B) ☐

(C) ☐ (D) ☐

(8) يوضح المخطط البياني (1-8) طائرة تتجه نحو الشمال الشرقي وتؤثر عليها رياح تتجه نحو الغرب بسرعة (20 km/h).

(أ) ارسم على المخطط البياني (1-8) اتجاه محصلة السرعة التي تتحرك بها الطائرة. [2]




المخطط البياني (1-8)

(ب) أوجد محصلة السرعة التي تتحرك بها الطائرة بيانياً (تذكر ان تتضمن الاجابة مقدارا واتجاها).

[3]

9) الشكل البياني (1-9) يوضح منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) لطالب يقود دراجة.




الشكل (1-9)

أ) احسب تسارع الدراجة خلال (6.0) ثواني الأولى من بدء الحركة. (موضحاً خطوات الحل)

[2]

ب) احسب الإزاحة التي قطعها الطالب خلال s (12.0). (موضحاً خطوات الحل)

[3]




المخطط (1-10)

10) المخطط البياني (1-10) يمثل حركة قذيفة قذفت رأسياً لأعلى .
علماً بأن (تسارع الجاذبية الأرضية $= 9.81 \text{ m/s}^2$).

- احسب أقصى ارتفاع تصل إليه القذيفة عن سطح الأرض
بإهمال مقاومة الهواء. (موضحاً خطوات الحل)

[3]

11) انطلقت قذيفة من مدفع بسرعة متجهه ابتدائية تساوي 120 m/s بزاوية 30° مع المحور الأفقي، كما يوضحه الشكل (1-11).



الشكل (1-11)

- احسب البعد الأفقي التي تصل إليه القذيفة عن موقع المدفع


[4]

12) قذفت كرة أفقيا من ارتفاع معين. يوضح الجدول (1-12) مقدار المسافة الرأسية المقطوعة مع الزمن:

الجدول (1-12)

المسافة الرأسية $(m) \times 10^{-2}$	0.0	0.8	3.1	7.1	12.6
الزمن $(s) \times 10^{-2}$	0.0	4.0	8.0	12.0	16.0

أ) ارسم منحنى التمثيل البياني بين المسافة الرأسية (S) على المحور الرأسي والزمن (t) على المحور الأفقي. [3]



ب) احسب تسارع الجاذبية من خلال نتائج هذه التجربة .

[3].....

13) مقياس مدى صعوبة تغيير السرعة المتجهة لجسم ما. (ظلل الإجابة الصحيحة) [1]

☐ قوة الاحتكاك

☐ قوة المقاومة

☐ قوة التلامس العمودية

☐ القصور الذاتي

14) يتحرك صندوق كتلته (2 kg) بسرعة ثابتة على سطح خشن تحت تأثير قوتين كما يوضح الشكل (1-14)

ارسم على الشكل مخطط بقية القوى المؤثرة على الصندوق موضحا عليها القيم. [3]



الشكل 1-14

- 15) تتباطأ سيارة كتلتها (2100 kg) بمقدار (2 m/s^2) ، عندما اقتربت من إشارة مرور.
ما مقدار القوة المحصلة التي تجعلها تتباطأ بهذا المقدار بوحدة (N) ؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [1]


4200 ☐

3020 ☐

2102 ☐

1050 ☐

- 16) تؤثر قوتان $F_1 = (15 \text{ N})$ و $F_2 = (20 \text{ N})$ على جسم ما ، كما في الشكل (1-16) احسب مقدار محصلة القوى المؤثرة على الجسم باستخدام مثلث المتجهات (يجب أن تتضمن الإجابة مقداراً واتجهاً).




الشكل (1-16)

[3]

- 17) تم سحب صندوق بقوة قدرها (20 N) على سطح أملس فأكتسب تسارعاً قدره (8 m/s^2) . كما هو موضح في الشكل (1-17).


- احسب قوة التلامس العمودية المؤثرة على الصندوق بوحدة (N) . (موضحاً خطوات الحل)



الشكل (1-17)

[3]

18) يمثل المخطط (1-18) القوى المؤثرة على جسم ما .




مخطط (1-18)

- حدد مقدار واتجاه القوة التي يجب إضافتها على الجسم لكي يكون متزنا

.....

[3]

19) يوضح الشكل (1-19) اسطوانة من المعدن معلقة بواسطة حبلين في حالة اتزان. قوة شد الحبل الأول ($T_1 = 36 \text{ N}$) أفقياً و قوة شد الحبل الثاني (T_2) تصنع مع الأفقي زاوية قدرها (30°) . احسب وزن الأسطوانة المعدنية . (موضحاً خطوات الحل)



الشكل 1-19

.....

 [3]

6

— انتهت الأسئلة —

القوانين والثوابت

م	الوحدة	القوانين
1	المهارات العملية	النسبة المئوية لعدم اليقين = $\frac{\text{قيمة عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100\%$
2	السرعة والسرعة المتجهة	$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t}$
3	الحركة المتسارعة	$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{u}}{t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$
4	القوى	$\vec{F} = m\vec{a}$

الثوابت
$g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$

قوانين رياضية تكاملية
مساحة المستطيل = الطول × العرض مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$ $\text{Tan} \emptyset = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

المسودة